Fonte Cal (de Pinhel)

Vass7R03s306-310

Why 386

Vassal-Montpellier

Fonte Cal (de Rushel) 7 R 3 s 306.360





domindented and admindented



NOM Forte Cal

EMPLACEMENT 7 Rg 3 1 306. 310

| Souche | Nbre yeux | Débou début | rrement mi/déb | Nbre grap | Ferti- Floraison lité début mi/f fin | | | Vé: début | raison mi/v | Maturité | | | | | |
|--|--------------|----------------|-------------------|--------------|---|--|--|--------------|----------------|----------|--|-----|--|--|--|
| 2 | 2 | 15,3 | 18.3. | O | | | | | | | | 9.9 | | | |
| 4 5 | 3 2 | 15,3 | 18.3 × | 1 | Pour : Mill : | | | | | | | | | | |
| | ک | le 18. | 3.91 | | disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: 2009 Vigueur: 45 | | | | | | | | | | |
| the statement of the st | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1992 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|--------|---|---|---------------------------------|-----------------|------|------|----------------|----------|-----|--|--|
| NOM Fonte Cal | | | | | EMPLACE | MENT | 7 R3 A 306. 310 | | | | | | | |
| Souche | Nbre Débourrement yeux début mi/déb | | | | | Ferti- Floraison début mi/f fin | | | | raison mi/v | Maturité | | | |
| 1 | a | 11 1 | 1/ 2 | | 1 | 22,5 | 26.5 | 30.5 | 30,7 | 49 | 8.8 | 7.9 | | |
| 3 | 3 | 16,3 | 163 ~ | 0 | Grappe: G - M - P Dim: 6 Compacité: L - M C | | | | | | | | | |
| 4 5 | | | 19.3 × | | Pour : 0 Mill ; 0 Baie : TG - G - M - P Dim: 16 × 14 | | | | | | | | | |
| | | 16.3 89 | | | disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ANNEE 1993

NOM Fonte Cal (de Pintel) EMPLACEMENT 7R33-306,310

Pgal 4.83.

| ouche | Nbre yeux | Débou début | rrement mi/déb | Nbre grap | Ferti- | Ferti- Floraison lité début mi/f fin | | | | raison mi/v | Maturité | |
|---------|--------------|-------------------|-------------------------|--------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------------------|----------|----------|
| 2 3 4 5 | 4 5 4 4 | 183 113 113 | 22.3× 16.3× 16.31 | 0 0 0 | Grappe Pour : Baie : Couleu: Saveur Pépins Port : | : G - (disc-sr: B-C); s - | M - P Mill Mill Phell Rephell Mir-Re-I M - al | Dim: 1: - P Di 1-ov-c Rg-N r - fo | im : obov-cy Jus | Compact vl-fus : inc | cité: | L - M -C |

ANNEE: 1995

NCM Foute Cal

EMPLACEMENT 7 R 3 s 306. 310

| | (| m) | | | | | | | | | _ | |
|-------------|--------------|------------------------------|--|------|----------------|---|--|------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| ouche | Nbre yeux | Débourrement début mi/déb | | | Ferti- lité | Floraison début mi/f fin | | Véraison début mi/v fin | | | Maturit é | |
| X 2 | 2 | | | 1 | Λ | 27.5 | 30.5 | 3.6 | 247 | 1.8 | 78 | 28.28 |
| 3 4 5 | 1328 | | | 0001 | Couleu Saveur | : G - : G - : G - : B - | M - P Mil S - M sph-el Gr-Rs- m - a c - ap | Dim 1: - P D 1-ov- Rg-N r - fo | im : obov-c | Compa yl-fus : inc | cité: | : L - i1 -C |
| | | | | | | | | | | | | |

AMMEE: 1996 HOM Fonte Cal (de Rinfel) EMPLACIMENT. 7 R 3 A 366. 310 4.83 Nbre Débourrement Ubre Ferti-Floraison Véraison debut mi/deb grap lite debut mi/f | fin debut mi/v fin Maturité CR.2 11.3 x 28.2 14.3. Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- C 28.2 4.3 + Four: Mill: Baie: TC - G - M - P Dim: 15.2 2121 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 1) 6 4.3.96 (-12) Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N dus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: Vigueur :

AMMEET: 1997
HOM Fonte Cal

4

EMPLACEMENT 4 R3 1306.310

Nbre Débourrment Ubic Ferti-Thoraison Véraison iche debut mi/t fin debut mi/v fin Matur 116 Litto yeux debut mi/deb grap X 1 9 TL 3 Grappe: : - (1) - P Dim : /4 Compacité : 1. - 1: C NOTL Mill: 0 rour: 3 naio : To - G - (1) - P Dim: 18 X 16 0 4 disc-spheell-ov-obov-cyl-fus Couleur : BG1-Rs-Rg-N dus : (Inc) - coloré Saveur : (s) - m - ar - fox - herb Púpins (avec) - apyrène Fort : Vigueur :

| HOM F | | | TL | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|----------|----------------|----------------------|---|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------|------------------------------|--|--|
| tche Hbre | rrement mi/déb | | Ferti- lité | Flo debut | raison mi/E | fin | võ debut | raison mi/v | fin | Maturité | | |
| 12 12 H H H H M | | 50000 15 | | : G TG disc r : B | M - P Mil S - M sph-el Gr-Rs- m - a | Dim L: - P D 1-ov- Rg-N r - fe | im : obov-c | Compa y1-fus : inc | citó: | 31 - 8 +3 : 1, + 11 -C | | |

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Fonte ral (de Pinhel) 7. R3 0 306-310 (0-4)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalés - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 200 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la pramière feuille détachée est à liséré carminé, La couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux (1) - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 203.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Potalement - sillon - partiellement.

N° d'ordre : Fronte Cal (de linhel)
Désignation : 7R3s-306-310s-4
Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Nocuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265)

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

N° d'ordre: Fonte -Cal (de l'inhel)
Désignation:
Emplacement: 7 R 30 - 306-340 6-4)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142) - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laireuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - movenne

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 160 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Fonte Cal (de Pinhel) 7R3s-306-310s.2

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions: x41).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84) - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x 17). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée \$2/- pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111. A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121/. A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131) - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 134) A peau fine 135) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139)- molle 140 - peu juteuse. Aveq pepins - apyrene.

Fonte Cal (de Linhel) 7 R3 s-306-340 A13

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2)

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2)

: saillant (1) - efface(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

```
N° d'ordre :
Désignation : Fonte Cal (de Suibel)
Emplacement : 7 R 3 A 306.310
```

```
: 1 - 2 - 3
: 4 - 5 - 6
Angle des nervures
Sexe
                                         : 7 - (8) - 9
L1/L2
L2/L : 10 - 11

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
                                          : <u>40</u> - <u>41</u>
: 42 - <u>43</u> - 44
Dents : forme
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 59 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües